



Norflunix Inyectable

Para el alivio de la inflamación y dolor asociados con síndrome de metritis, mastitis y agalactia (MMA)

Norflunix Inyectable



Las propiedades antiendotóxicas de **Norflunix Inyectable**, son de gran ayuda para el tratamiento, ya que durante el Síndrome MMA se produce la síntesis de endotoxinas, citoquinas y prostaglandinas.

NORFLUNIX INYECTABLE es la herramienta necesaria para hacer más rentable su explotación.



Para el alivio de la inflamación y dolor asociados con síndrome de metritis, mastitis y agalactia (MMA)

En las explotaciones porcinas, una de las patologías más habituales y costosas es el **Síndrome MMA**. Con Norflunix Inyectable se consigue:

- Eliminación rápida de la fiebre
- Reducción de la ubre inflamada
- Disminución de la descarga vaginal
- Restauración del estado fisiológico
- Normalización de la producción de leche
- Incremento del apetito
- Menor mortalidad de los lechones
- Incremento de la ganancia media de peso diaria



Norflunix Inyectable

COMPOSICION:

Norflunix inyectable es una solución transparente incolora para administración parenteral que contiene 50 mg de flunixinio (meoglumina) USP, 5 mg de fenol Ph.Eur. como conservante y 2,5 mg de formaldehído sulfoxilato sódico dihidrato NF como antioxidante por ml.

DESCRIPCIÓN:

El flunixinio meoglumina es un analgésico relativamente potente, no narcótico y no esteroideo con propiedades antiinflamatorias y antipiréticas.

INDICACIONES:

Norflunix inyectable está indicado para la administración a cerdos para el alivio de la inflamación y el dolor asociados con síndrome de metritis, mastitis y agalactia (MMA).

ESPECIES DE DESTINO, POSOLOGIA Y

ADMINISTRACIÓN:

Cerdos: Deberán administrarse 2,2 mg/kg de peso vivo (2ml/45kg) mediante inyección I.M. profunda (5 cm). Flunixinio no debe ser depositado en el tejido adiposo. Pueden administrarse 1 ó 2 inyecciones separadas por un intervalo de 12 horas. El número de tratamientos a administrar (uno o dos) dependerá de la respuesta clínica obtenida.

CONTRAINDICACIONES:

No se han descrito.

PRECAUCIONES DE USO:

No administrar el producto a animales en gestación. Ante la ausencia de estudios de incompatibilidad, este producto farmacéutico no se debe mezclar con otros medicamentos.

En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua. Para evitar posibles reacciones de sensibilización, evitar el contacto con la piel. Deben utilizarse guantes durante la aplicación.

El producto puede causar reacciones en personas sensibles. En caso de hipersensibilidad conocida a los antiinflamatorios no esteroideos, evitar la manipulación del producto. Las reacciones pueden ser importantes.

INTERACCIONES:

No se han realizado estudios para determinar la actividad de Norflunix cuando se administra concomitantemente con otras drogas. Los pacientes que requieran terapia adjunta deben ser cuidadosamente controlados con el fin de determinar la compatibilidad con otras drogas.

TIEMPOS DE ESPERA:

Carne: 21 días después del último tratamiento.

CONSERVACION:

Conservar a menos de 25 °C. Proteger de la luz. Conservar fuera del alcance de los niños. Evitar su contaminación. Después de la aplicación de la primera dosis, debe utilizarse el producto durante el plazo de 28 días. Desechar el producto no utilizado.

PRESENTACIONES:

Viales multidosis de 100 ml.

ESPECIALIDAD FARMACOLÓGICA DE USO VETERINARIO. PRESCRIPCIÓN VETERINARIA

Reg. nº: 1493 ESP

Fabricado por:

Norbrook Laboratories Ltd., Newry, Co. Down, N. Ireland



Distribuido por:

Laboratorios Karizoo s.a.
Pl. La Borda, Mas Pujades 11-12, 08140 Caldes de Montbui (Barcelona).
Tel. 93 865 41 48, Fax 93 865 46 48, karizoo@karizoo.com

laboratorios
Karizoo s.a.

