


Noromectin[®] 0,6 g/100 g Premezcla para Porcino

5 kg

Ivermectina



DENOMINACIÓN DEL PRINCIPIO

ACTIVO Y OTRAS SUSTANCIAS

Ivermectina 0,6g/100g

FORMA FARMACÉUTICA

Premezcla medicamentosa

ESPECIES DE DESTINO

Porcino (Cerdos de engorde y adultos)

INDICACIONES

Noromectin 0,6g/100g Premezcla para Porcino está indicado para el tratamiento de los siguientes vermes redondos gastrointestinales, vermes pulmonares, piojos y ácaros de la sarna en cerdos adultos y de engorde.

Vermes gastrointestinales: *Ascaris suum* (adultos y cuarto estadio larvario), *Hyostrongylus rubidus* (adultos y cuarto estadio larvario), *Oesophagostomum* spp (adultos y cuarto estadio larvario), *Strongyloides ransomi* (adultos)

Vermes pulmonares: *Metastrongylus* spp

Piojos: *Haematopinus suis*

Ácaros de la sarna: *Sarcoptes scabiei* var *suis*

La administración de Noromectin 0,6g/100g Premezcla para Porcino a cerdas gestantes antes del parto controla de forma efectiva la transmisión a través de la leche de *S. ransomi* a los lechones.

FORMA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Noromectin 0,6g/100g Premezcla para Porcino debe ser incorporado al pienso y administrado a los animales durante siete días consecutivos a la dosis recomendada de 100 µg de

ivermectina por kg de peso vivo y día. Antes de su uso deberá leer el prospecto.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 12 días

ADVERTENCIAS ESPECIALES

IMPORTANTE: Antes de su uso deberá leer el prospecto contenido en el envase.

FECHA DE CADUCIDAD

Una vez incorporado al pienso en harina o al pienso granulado, el pienso medicamentoso se deberá utilizar antes de 3 meses.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

No conservar a temperatura superior a 25°C.

Para asegurar la completa dispersión del producto se deberá mezclar primero con una cantidad adecuada de pienso antes de incorporarse en la mezcla final.

PRECAUCIONES ESPECIALES QUE DEBAN OBSERVARSE AL ELIMINAR EL MEDICAMENTO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, SUS RESIDUOS

EXTREMADAMENTE PELIGROSO PARA PECES Y ORGANISMOS ACUÁTICOS. No contaminar aguas superficiales o zanjas de drenaje con el producto o con los envases usados. Los animales tratados no deberán tener acceso directo a aguas superficiales o zanjas de drenaje durante el tratamiento. El estiércol de los animales tratados no se deberá esparcir sobre tierras

donde la superficie se puede desprender. El producto no usado y sus residuos deben eliminarse de forma segura de acuerdo con las normativas locales.

Únicamente para uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Deberán tenerse en cuenta las disposiciones oficiales sobre la incorporación de premezclas medicamentosas a la alimentación animal.

Manténgase fuera del alcance y la vista de los niños.

Titular de Autorización de Comercialización:

Norbroom Laboratories Limited
Station Works, Camlough Road,
Newry, Co. Down,
BT35 6JP, Irlanda del Norte

Representante:

Laboratorios Karizoo s.a.
P.I. La Borda, Mas Pujades 11-12
08140 Caldes de Montbui (Barcelona)
España

laboratorios
Karizoo s.a. K

NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

LOTE:

CAD:



Norbroom[®]



200 x 150 mm