

## Tablas de Dosificación

### CEBO

Nivel de inclusión en pienso (g Noromectin 0,6g/100g Premezcla para Porcino/t pienso):

Cebo: 100 µg/kg p.v/d, durante 7 días

Consumo Kg	Rango de pesos (kg)												
	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1,4	476	536	595	655	714	774	833	893	952	1012	1071	1131	1190
1,5	444	441	556	611	667	722	778	833	889	944	1000	1056	1111
1,6	417	469	521	573	625	677	729	781	833	885	938	990	1042
1,7	392	441	490	539	588	637	686	735	784	833	882	931	980
1,8	370	417	463	509	556	602	648	694	741	787	833	880	926
1,9	351	395	439	482	526	570	614	658	702	746	789	833	877
2	333	375	417	458	500	542	583	625	667	708	750	792	833
2,1	317	357	397	437	476	516	556	595	635	675	714	754	794
2,2	303	341	379	417	455	492	530	568	606	644	682	720	758
2,4	278	313	347	382	417	451	486	521	556	590	625	660	694
2,6	256	288	321	353	385	417	449	481	513	545	577	609	641
2,8	238	268	298	327	357	387	417	446	476	506	536	565	595
3	222	250	278	306	333	361	389	417	444	472	500	528	556
3,2	208	234	260	286	313	339	365	391	417	443	469	495	521