

CEBO

Nivel de inclusión en pienso (kg PIM* Noromectin Premezcla 1:5 / t pienso):

Cebo: 100 µg/kg p.v/d, durante 7 días

Consumo Kg	Rango de pesos (kg)													
	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
1,4	2,86	3,21	3,57	3,93	4,29	4,64	5,00	5,36	5,71	6,07	6,43	6,79	7,14	
1,5	2,67	2,65	3,33	3,67	4,00	4,33	4,67	5,00	5,33	5,67	6,00	6,33	6,67	
1,6	2,50	2,81	3,13	3,44	3,75	4,06	4,38	4,69	5,00	5,31	5,63	5,94	6,25	
1,7	2,35	2,65	2,94	3,24	3,53	3,82	4,12	4,41	4,71	5,00	5,29	5,59	5,88	
1,8	2,22	2,50	2,78	3,06	3,33	3,61	3,89	4,17	4,44	4,72	5,00	5,28	5,56	
1,9	2,11	2,37	2,63	2,89	3,16	3,42	3,68	3,95	4,21	4,47	4,74	5,00	5,26	
2	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
2,1	1,90	2,14	2,38	2,62	2,86	3,10	3,33	3,57	3,81	4,05	4,29	4,52	4,76	
2,2	1,82	2,05	2,27	2,50	2,73	2,95	3,18	3,41	3,64	3,86	4,09	4,32	4,55	
2,4	1,67	1,88	2,08	2,29	2,50	2,71	2,92	3,13	3,33	3,54	3,75	3,96	4,17	
2,6	1,54	1,73	1,92	2,12	2,31	2,50	2,69	2,88	3,08	3,27	3,46	3,65	3,85	
2,8	1,43	1,61	1,79	1,96	2,14	2,32	2,50	2,68	2,86	3,04	3,21	3,39	3,57	
3	1,33	1,50	1,67	1,83	2,00	2,17	2,33	2,50	2,67	2,83	3,00	3,17	3,33	
3,2	1,25	1,41	1,56	1,72	1,88	2,03	2,19	2,34	2,50	2,66	2,81	2,97	3,13	

Dosis más frecuente